

Options Pour le Vaccin Contre le COVID-19

Cet outil d'aide à la décision est destiné aux personnes âgées de 18 ans ou plus. Les personnes ayant déjà eu des réactions allergiques graves doivent en parler avec leur professionnel de santé avant de se faire vacciner. Les informations sur le vaccin pour les personnes enceintes ou

qui allaitent, ou dont le système immunitaire est plus faible sont limitées. Les informations ci-dessous concernent les vaccins disponibles aux États-Unis. L'endroit où vous vivez peut changer le moment où vous pouvez vous faire vacciner et le type de vaccin disponible.

QUESTIONS	Ne Pas se Faire Vacciner	Vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna	Vaccins Johnson & Johnson/Janssen
En quoi cela consiste ?	Continuez de garder vos distances , d'éviter les rassemblements, de porter un masque et de vous laver souvent les mains.	Vous aurez au total 2 injections dans le bras, à 3 ou 4 semaines d'intervalle . Certains pays choisissent de donner la deuxième injection après plus de 3 ou 4 semaines après la première. Continuez de garder vos distances et de porter un masque en public ou avec des personnes à haut risque de COVID-19. Évitez les rassemblements et lavez-vous souvent les mains.	Vous aurez 1 injection dans le bras . Continuez de garder vos distances et de porter un masque en public ou avec des personnes à haut risque de COVID-19. Évitez les rassemblements et lavez-vous souvent les mains.
Quels sont les avantages ?	Vous n'aurez pas les effets secondaires qui sont fréquents avec le vaccin contre le COVID-19.	Vous aurez beaucoup moins de risques d'avoir le COVID-19 . Deux semaines après la deuxième injection, il est plus prudent de rendre visite à des personnes qui ont : <ul style="list-style-type: none"> • eu le vaccin. • n'ont pas eu le vaccin, mais se trouvent dans un ménage à faible risque de COVID-19. Si assez de personnes se font vacciner, il y a plus de chances d'arrêter la pandémie .	Vous aurez beaucoup moins de risques d'avoir le COVID-19 . Deux semaines après l'injection, il est plus prudent de rendre visite à des personnes qui ont : <ul style="list-style-type: none"> • eu le vaccin. • n'ont pas eu le vaccin, mais se trouvent dans un ménage à faible risque de COVID-19. Si assez de personnes se font vacciner, il y a plus de chances d'arrêter la pandémie .

Suite page suivante

Options Pour le Vaccin Contre le COVID-19

QUESTIONS	Ne Pas se Faire Vacciner	Vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna	Vaccins Johnson & Johnson/Janssen
<p>Quels sont les effets secondaires ou les risques à court terme ?</p>	<p>Vous aurez plus de risques d'avoir le COVID-19.</p> <p>Les symptômes du COVID-19 incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de la fatigue. • de la fièvre ou des frissons. • des douleurs musculaires. • des essoufflements et de la toux. <p>Le COVID-19 peut aussi causer une maladie grave, une hospitalisation ou la mort.</p>	<p>Les effets secondaires fréquents au cours des 3 premiers jours incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de la fatigue. • de la fièvre ou des frissons. • des douleurs musculaires. • des maux de tête. • des douleurs dues à l'injection. <p>Ces effets sont plus probables lors de la deuxième injection. Il s'agit de réactions normales que le vaccin peut causer. Elles disparaissent généralement en 1 ou 2 jours.</p> <p>Les effets secondaires et les risques graves étaient rares dans les grandes études sur les vaccins contre le COVID-19.</p>	<p>Les effets secondaires fréquents au cours des 3 premiers jours incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • de la fatigue. • de la fièvre ou des frissons. • des douleurs musculaires. • des maux de tête. • des douleurs dues à l'injection. <p>Il s'agit de réactions normales que le vaccin peut causer. Elles disparaissent généralement en 1 ou 2 jours.</p> <p>Les effets secondaires et les risques graves étaient rares dans les grandes études sur les vaccins contre le COVID-19.</p>
<p>Quels sont les effets secondaires ou les risques à long terme ?</p>	<p>Parfois, les symptômes aigus peuvent durer longtemps. Certains patients ont de nouveaux symptômes. Les nouveaux symptômes peuvent inclure la perte de cheveux, des difficultés de concentration ou de mémoire, ou des lésions pulmonaires.</p>	<p>Il n'existe pas d'étude à long terme sur les vaccins contre le COVID-19. Mais les effets secondaires ou les risques dus aux vaccins sont rares après 6 semaines.</p>	<p>Il n'existe pas d'étude à long terme sur les vaccins contre le COVID-19. Mais les effets secondaires ou les risques dus aux vaccins sont rares après 6 semaines.</p>
<p><i>Suite page suivante</i></p>			

Options Pour le Vaccin Contre le COVID-19

QUESTIONS	Ne Pas se Faire Vacciner	Vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna	Vaccins Johnson & Johnson/Janssen
Que dois-je savoir d'autre ?	Si vous ne voulez pas vous faire vacciner maintenant mais changez d'avis plus tard, vous pourrez vous faire vacciner à ce moment-là.	<ul style="list-style-type: none"> • Vous ne pouvez pas être infecté par le COVID-19 à cause du vaccin. • Le vaccin ne peut pas changer votre ADN. • Il est possible d'attraper le COVID-19 après avoir été vacciné. Vous devez donc continuer à prendre des précautions. • Si vous avez eu le COVID-19, le vaccin pourrait toutefois réduire votre risque de l'avoir à nouveau. • Le vaccin Pfizer/BioNTech est disponible pour les personnes âgées d'au moins 16 ans. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vous ne pouvez pas être infecté par le COVID-19 à cause du vaccin. • Le vaccin ne peut pas changer votre ADN. • Il est possible d'attraper le COVID-19 après avoir été vacciné. Vous devez donc continuer à prendre des précautions. • Si vous avez eu le COVID-19, le vaccin pourrait toutefois réduire votre risque de l'avoir à nouveau.

Les gens ont probablement vu des chiffres indiquant dans quelle mesure les vaccins peuvent réduire le risque d'avoir le COVID-19. Parfois, ces chiffres semblent différents selon les vaccins. Essayer de comparer ces chiffres n'est pas une comparaison scientifique équitable et pourrait induire en erreur. C'est pourquoi cette aide à la décision ne présente pas ces chiffres.

*Les outils d'aide à la décision Option Grid™ de "DynaMed Shared Decisions" sont revus et mis à jour en continu pour refléter les dernières données disponibles. **Dernière mise à jour** : 26 avril 2021*



Téléchargez la dernière version de cet outil d'aide à la décision à l'adresse suivante:
<http://ebSCO.is/DynaMed-Shared-Decisions-Vaccin-Contre-le-COVID-19>

Learn more about EBSCO Clinical Decisions at clinicaldecisions.com